

脊髄性筋萎縮症（スピンラザ投与）の治療を受ける患者さんへ

患者氏名：

主治医：

担当看護師：

項目	入院：治療前日	治療日（治療前）	治療日（治療後）	退院：治療後1日目
達成目標	・治療の目的を理解することができる		<ul style="list-style-type: none"> ・発熱がない ・注射部位の痛みがない ・注射部位の出血がない ・嘔吐がない ・頭痛がない ・足のしびれがない ・尿が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱がない ・注射部位の痛みがない ・注射部位の出血がない ・嘔吐がない ・頭痛がない ・足のしびれがない ・尿が出る ・退院指導の内容が理解できる
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ	・持参された薬の確認を薬剤師が行います	<ul style="list-style-type: none"> ・点滴をします ・髄腔内（背中から）よりお薬を投与します 	<ul style="list-style-type: none"> ・夕食がとれたら点滴を抜きます 	<ul style="list-style-type: none"> ・注射部位を消毒し絆創膏を貼ります
検査	<ul style="list-style-type: none"> ・心電図 ・レントゲン ・肺機能検査 ・採血 		<ul style="list-style-type: none"> ・心電図 	
活動・安静度	・制限はありません		<ul style="list-style-type: none"> ・医師の許可があるまでベッド上安静です ・治療後1時間程度は、頭を上げないようにしてください 	
食事	<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません ・治療を手術室で行う場合には、指示した時間から飲んだり食べたりできません 	<ul style="list-style-type: none"> ・飲んだり食べたりできません 	<ul style="list-style-type: none"> ・医師の許可が出たら水分をとることができます ・水分をとった後に吐き気がなければ、夕食から食事が始まります 	<p>【退院指導】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入浴の際に、注射部位の絆創膏をはがしてください <p>以下の症状がある時はご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・38℃以上の発熱 ・注射部位の痛み ・注射部位の出血 ・嘔吐 ・頭痛 ・足のしびれ ・尿が出にくい
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要時、身体を拭きます 		
排泄			<ul style="list-style-type: none"> ・安静制限中に尿意や便意をもよおした時はお知らせください 	<p>（ご家族様へ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記症状以外に、いつもと様子が違う、不機嫌が続いているなどの気になる症状がある時はご連絡ください
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> ・病棟クラークが入院オリエンテーションを行います ・主治医より治療についての説明があります ・手術室で行う場合は、麻酔科医からの説明があります 	<ul style="list-style-type: none"> ・治療は、検査室（または手術室）で行います ・手術室で行う場合は、術衣に着替えます 	<ul style="list-style-type: none"> ・出血や痛み、吐き気などがあるときはお知らせください 	<p>【緊急連絡先】</p> <p>月～金 時間内(8:30～16:30) 小児科外来:0985-85-9881 土日・祝日 時間外(16:30～8:30) 4階東病棟:0985-85-1776</p> 

※この経過表は入院から退院までのおおよその経過をお知らせするものです。諸所の理由で経過通りにいかない場合もありますことをご了承ください。