

ヘマンジオルシロップ投与(血管腫)を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名担当医
担当看護師

配付日

	1病日 /	2病日 /	3病日 /	4病日 /	【退院後の生活について】
達成目標	・治療について理解できる			・退院指導の内容を理解できる	<ご家族様へ> 以下の場合、ヘマンジオルシロップを内服させないでください ・本人に風邪などの症状があり、具合が悪い場合 ・母乳を与える母親が、薬を内服している場合 以下の場合、その回の内服を中止し、次回、予定通りに内服させていただきます ・内服を忘れていた ・下痢やおう吐をしている ・お腹を空かせている 以下の症状がある時は、ご連絡ください ・顔色が青白くなり、発汗、震え、脈が早い ・反応が鈍い ・脱力、手足が冷たい ・顔色や手足の色が悪い ・咳き込む、早い呼吸、息苦しそうにしている ・喘鳴が聞こえる、顔色が青白い ・いつもより、ミルクの飲みが悪いなど
内服	・入院時に薬剤師より持参薬および服薬状況について確認します ・お薬(ヘマンジオルシロップ小児用)を2日分お渡しします 指示された量を、朝夕食後すぐに内服してください 		・お薬(ヘマンジオルシロップ小児用)を1日分お渡しします 指示された量を、朝夕食後すぐに内服してください	お薬(ヘマンジオルシロップ小児用)を8日分お渡しします 指示された量を、朝夕食後すぐに内服してください	
検査	・身長・体重測定 	・心電図、酸素飽和度モニターをつけます		・医師の指示でモニターを外します	【緊急連絡先】 ・平日時間内(8:30~17:00) 小児科外来:0985-85-9881 ・土日・祝日、時間外 4階東病棟 0985-85-1776 ・意識がない場合は救急車を呼んでください 
	・血糖測定 (お薬初回投与時、1時間後、2時間後)	・血糖測定 (お薬増量時、1時間後、2時間後)			
処置	・血管腫の写真を撮影します(毎日)				
食事	・制限はありません				
活動・安静					
清潔	・沐浴ができます 				
説明	・医師が治療の説明をします ・感染予防、転落予防について説明します ・入院オリエンテーションを行います ・患者用クリニカルパスを用いて、治療スケジュールについて説明します	・専用のスポイドで、お薬の量を量る練習をします 		・退院後の生活について説明します	

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。