

患者ID
氏名

レンビマ+キイトルーダ療法を受けられる患者さんへ

担当医
担当看護師
配布日

	入院:1病日 /	2病日 /	3病日 /	4～6病日 / ～ /	7病日 /	8病日:退院 /	【退院後の緊急連絡について】
達成目標	・治療について理解できる	・循環動態が安定している ・収縮期血圧が140mmHg以下である			・退院指導の内容を理解できる		・治療の影響で、高血圧になる場合がありますので、1日2回、血圧を測定してください 以下の症状がある時はご連絡ください ・食事が摂れない ・嘔吐が続く ・体のだるさが続く ・血圧140/90mmHg以上が、2日以上続く 【緊急連絡先】 ・平日時間内(8:30～17:00) 産科・婦人科外来 0985-85-9332 ・土日・祝日、時間外 4階西病棟 0985-85-1746
内服	・薬剤師が、持参薬及び服薬状況について確認します	・抗がん薬を内服します(毎日)					
注射		・点滴をします ・治療後は点滴を抜きます					
検査	・採血 ・尿検査					・採血	
	・身長・体重測定	・体重測定(毎日)					
処置		・抗がん薬投与中は心電図、酸素飽和度モニターをつけます。治療後は外します					
食事	・制限はありません						
活動・安静	・制限はありません	・点滴中は病棟内でお過ごしください	・制限はありません				
清潔	・制限はありません						
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒・転落予防について説明をします ・外来化学療法室のオリエンテーションビデオを視聴します				・キイトルーダとレンビマ治療に関するパンフレットを用いて、退院後の生活について説明します		
その他		・点滴をしているところに痛みや発赤、腫脹がある場合は、ナースコールでお知らせください					
		・抗がん薬投与終了から2日間は、尿や便に抗がん薬が含まれます。排泄時、尿・便の飛散により、他の方々のお身体にも影響を及ぼす可能性があるため、排泄後は、水を2回流し、便座を拭きあげてください					

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がございましたらいつでもお尋ねください。