

# 脊髄性筋萎縮症の治療を受けられる患者さんへ

患者ID  
氏名

担当医  
担当看護師  
配布日

	入院:1病日	2病日		3病日:退院	【退院後の生活について】
	治療前日	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日目	
達成目標	・治療について理解できる		・循環動態が安定している ・嘔気・嘔吐がない ・頭痛がない ・注射部位の出血、痛みがない	・退院指導の内容を理解できる	<p>・入浴の際に腰の注射部位の絆創膏を剥がしてください</p> <p>以下の症状がある時はご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・38.0℃以上の発熱</li> <li>・注射部位の痛み</li> <li>・注射部位の出血</li> <li>・嘔吐</li> <li>・頭痛</li> <li>・足のしびれ</li> <li>・尿がでにくい</li> <li>・いつもと様子が違う、不機嫌が続くなど気になる症状があるとき</li> </ul> <p>【緊急連絡先】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平日時間内(8:30~17:00)</li> <li>小児科外来</li> <li>0985-85-9881</li> </ul> <p>・土日・祝日、時間外</p> <p>4階東病棟</p> <li>0985-85-1776</li>
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します				
治療		髄腔内にお薬を注入をします			
注射		・医師の指示後、点滴をします 	・夕食の食事量をみて点滴を抜きます		
検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採血/尿検査</li> <li>・血ガス</li> <li>・レントゲン</li> <li>・心電図</li> <li>・肺機能</li> <li>・身長・体重・頭囲測定</li> </ul>   		・心電図 	・体重測定	
処置			・酸素飽和度モニターをつけます。目が覚めたらモニターを外します	・腰の注射部位を消毒し絆創膏を貼ります	
食事	・制限はありません	・医師の指示後、飲食はできません 	・医師の指示後、飲水から始め、吐き気がなければ夕食から食事が開始となります	・制限はありません	
活動・安静	・制限はありません	・病棟内でお過ごしください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の許可があるまではベッド上安静です。治療後1時間は頭元を上げないください</li> <li>・トイレに行きたい時はナースコールでお知らせください</li> <li>・身体を拭きます</li> </ul>	・制限はありません	
清潔	・シャワー浴をしてください 				
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入院オリエンテーションを行います</li> <li>・医師が治療の説明をします</li> <li>・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します</li> <li>・転倒転落予防について説明します</li> </ul>				
その他	・同意書は職員にお渡しください	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検査衣(手術衣)に着替えます</li> <li>・治療は検査室か手術室で行います</li> </ul>	・痛みや吐き気があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください 		



診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。