BRTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術)1日前入院

患者ID 氏名

担当医担当看護師 配布日

	入院:1病日 /		2病日 3病日 /		4病日 5~8病日 / ~ /		9病日:退院	【退院後の生活について】
	治療1日前	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3~6日目	治療後7日目	
達成目標	・治療について理解できる	•吐血			t血がない F血がない			
内服	・薬剤師が、持参薬及び服薬状況について確認します							判断で中断せず、医師の指示通りに内服して 下さい ・緩下剤であるラクツロースを内服し、毎日便
手術(IVR)			影室で治療します					が出るように調整して下さい ・病気の性質上、たんぱく質の合成ができず低 栄養になることがありますので、高たんぱく、 高エネルギーの食事を摂るようにしてください
注射		・点滴をします		1	・点滴を抜きます			・肝臓病では飲酒が病気を重症化させます。 禁酒を心掛けてください ・治療、入院により体力や下肢筋力の低下も
検査	・採血(2回)・ICG検査・レントゲン・身長・体重測定		・採血(3時間後)	- 採血-尿検査		·採血(術後4日目、6日目) ·尿検査(術後4日目、6日目)	•体重測定	あるため、無理せず散歩などから始め、体力の回復に努めてください。また、歩行時はゆっくり動くことを意識して、転倒に注意してください・感染症にかかると、体力が奪われ、病状を悪化させる危険性が高まります。マスク着用、外
処置	・臍の下から太ももまでを除毛します ・治療後の血流確認のため、両足の甲に印をつけます	・尿の管を入れます	・医師の診察後に穿刺部の圧 迫を解除し、尿の管を抜きます	刺部の圧を抜きます				一れるせる危険性が高まります。マスク有用、外 出後の手洗い・うがいを必ず行ってください 以下の症状がある時はご連絡ください ・吐気、食欲不振
食事	・制限はありません	・飲食はできません	・飲水できます・治療後3時間を経て、食事ができます	・制限はありません	8			・腹痛・黒色便・手足のむくみ・肌や目が黄色い
活動·安静	・制限はありません		・治療後3時間はベッド上安静です。その後、制限はありませんが、初めて歩くときは看護師が付き添いますので、ナースコールでお知らせください					・手が震えたり、意識がはっきりせず、会話・行動・書字がいつもと違う ・吐血 ・体調がすぐれない
清潔	・除毛後にシャワー浴をしてください	・洗面、歯磨きを済ませてください	・シャワー浴はできません 	・身体を拭きます	・シャワー浴がで	きます		【緊急連絡先】 •平日時間内(8:30~17:00) 内科外来: 0985-85-9883 •土日·祝日、時間外
説明	 ・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・術前オリエンテーションを行います ・感染予防、転倒・転落予防について説明します 					・退院後の生活について説明します		3階西病棟:0985-85-1745
その他	・同意書は職員にお渡しください ・手足の爪を切り、マニキュアは落としてください ・お化粧は落としてください 【必要物品】 ・T字帯1枚 ・水またはお茶500ml 2本 ・ストロー1本 ・バスタオル1枚	・検査衣に着替えます ・義歯、コンタクトレンズ、時計、アクセサリー等は外し、各自保管してください ・貴重品は、ご自身又はご家族で管理してください ・ご家族は、血管造影室の前でお待ちください	・痛みや発熱、吐き気があれば	お薬を使用しますので	、我慢せずにお知			なんでも

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。