

ドセタキセル(De06)の治療を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院: 1病日 /	2病日: 退院 /	【退院後の緊急連絡について】
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療について理解できる 38.0度以上の発熱がない ショック症状がない 	<ul style="list-style-type: none"> 退院指導の内容を理解できる 	<p>以下の症状がある時にご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> 全身倦怠感、疲労感 息苦しさ 手足のしびれ 38.0℃以上の発熱 筋肉痛や関節痛 <p>【緊急連絡先】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平日時間内 (8:30~17:00) 皮膚科外来 :0985-85-9889 土日・祝日、時間外 7階東病棟 :0985-85-1898
内服	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します 		
注射	<ul style="list-style-type: none"> 抗がん薬の点滴をします。治療後は点滴を抜きます 		
検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血 身長・体重測定 	<ul style="list-style-type: none"> 採血 	
処置	<ul style="list-style-type: none"> 初めて抗がん薬の治療をする場合は、心電図モニターを着け、医師の指示で外します 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 		
活動・安静	<ul style="list-style-type: none"> 点滴中は病室内でお過ごしください 点滴中にトイレに行く時は、ナースコールでお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 点滴後はシャワー浴ができます 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます 	
説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院オリエンテーションを行います 医師が治療の説明をします 薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします 本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します 感染予防、転倒転落予防について説明します がん薬物療法オリエンテーションを行います 	<ul style="list-style-type: none"> 「がん薬物療法を受けられた患者さんへ」のパンフレットを用いて、退院後の生活について説明します 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> 同意書は職員にお渡しください 吐き気があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください 点滴の薬剤が血管の外に漏れると、その部位の皮膚に炎症が起こることがあります。点滴が入っているところに痛みや発赤、腫れがある場合は、ナースコールでお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> ドセタキセル治療に関するパンフレットを用いて、治療の副作用と対処方法について説明します 抗がん薬投与終了から2日間は、尿や便に抗がん薬が含まれます。排泄時、尿・便の飛散により、他の方々のお身体にも影響を及ぼす可能性があるため、男性は座って排尿してください。排泄後は、水を2回流してください 	



診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。