

レンビマ+キイトルーダ療法を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院: 1病日 /	2病日 /	3病日 /	4~6病日 / ~ /	7病日 /	8病日: 退院 /	【退院後の緊急連絡について】
達成目標	・治療について理解できる					・退院指導の内容を理解できる	・治療の影響で、高血圧になる場合がありますので、1日2回、血圧を測定してください
内服	・薬剤師が、持参薬及び服薬状況について確認します	・抗がん薬を内服します(毎日)					
注射		・点滴をします ・治療後は点滴を抜きます 					以下の症状がある時はご連絡ください ・食事が摂れない ・嘔吐が続く ・体のだるさが続く ・血圧140/90mmHg以上が、2日以上続く
検査	・採血  ・尿検査  ・身長・体重測定 	・体重測定(毎日)				・採血 	
処置		・抗がん薬投与中は心電図、酸素飽和度モニターをつけます。治療後は外します					【緊急連絡先】 ・平日時間内(8:30~17:00) 産科・婦人科外来 0985-85-9332
食事	・制限はありません 						・土日・祝日、時間外 4階西病棟 0985-85-1746
活動・安静	・制限はありません	・点滴中は病棟内でお過ごしください	・制限はありません				
清潔	・制限はありません 						
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・医師の指示の下、薬剤師が電話フォローアップの説明をします。 ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒・転落予防について説明をします ・外来化学療法室のオリエンテーションビデオを視聴します				・キイトルーダとレンビマ治療に関するパンフレットを用いて、退院後の生活について説明します ・薬剤師が退院後の電話フォローアップの確認をします。		
その他		・点滴をしているところに痛みや発赤、腫脹がある場合は、ナースコールでお知らせください 					
		・抗がん薬投与終了から2日間は、尿や便に抗がん薬が含まれます。排泄時、尿・便の飛散により、他の方々のお身体にも影響を及ぼす可能性があるため、排泄後は、水を2回流し、便座を拭きあげてください					

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。