

トーリセル治療を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院:1病日 /	2病日 /	3~7病日 / ~ /	8病日 /	9~11病日 / ~ /	12病日 /	13病日:退院 /	【退院後の生活について】	
達成目標	・薬物療法について理解できる(内服継続の必要性、薬の内容、副作用)						・退院指導の内容を理解できる		<ul style="list-style-type: none"> ・処方されている薬は医師の指示通りに内服してください 以下の症状がある時はご連絡ください <ul style="list-style-type: none"> ・疲労感、めまい、頭重感 ・38.0度以上の発熱 ・便秘、下痢が続く ・嘔吐が続く ・鼻出血 ・痰、咳、息切れ、息苦しさ
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します	・副作用を予防する薬を内服します							
注射		・抗がん薬の点滴をします。治療後は点滴を抜きます							
検査	<ul style="list-style-type: none"> ・採血 ・レントゲン ・肺機能 ・身長・体重測定 			<ul style="list-style-type: none"> ・採血 		<ul style="list-style-type: none"> ・採血 	<ul style="list-style-type: none"> ・体重測定 		
食事	・制限はありません								
活動・安静	・制限はありません		・点滴中は病棟内でお過ごしください		・制限はありません				【緊急連絡先】 ・診療日時間内 (8:30~17:00) 泌尿器科外来 0985-85-9317
清潔	・シャワー浴ができます								・休診日・診療日時間外 7階東病棟 0985-85-1899
説明	<ul style="list-style-type: none"> ・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒転落予防について説明します 								
	・トーリセル治療に関するパンフレットを用いて、治療の副作用と、その対処方法について説明します								
その他	・同意書は職員にお渡しください		<ul style="list-style-type: none"> ・鼻出血や発疹、呼吸困難や倦怠感などの症状がある場合は、お知らせください ・食欲不振時には管理栄養士と相談しながら食べやすい食事を提供しますので、お知らせください 						
			<ul style="list-style-type: none"> ・点滴の薬剤が血管の外に漏れると、その部位の皮膚に炎症が起こることがあります。点滴が入っているところに痛みや発赤、腫れがある場合は、ナースコールでお知らせください ・抗がん薬投与終了から2日間は、尿や便に抗がん薬が含まれます。排泄時、尿・便の飛散により、他の方々のお身体にも影響を及ぼす可能性があるため、男性は座って排尿してください。排泄後は、水を2回流してください 						

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。