

ステロイドパルス療法

患者氏名

受け持ち医師:

受け持ち看護師:

項目	月日 入院	2日目	3日目	4日目
達成目標	ステロイドパルス療法が理解できる 気分が悪くなったらすぐに看護師に伝えることができる			退院指導について理解することができる 次回の受診日に来院することができる
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ	身長・体重を測ります ステロイドの内服はしません 点滴をします 点滴からステロイドのお薬を入れます	ステロイドの内服はしません 点滴からステロイドのお薬を入れます	ステロイドの内服はしません 点滴からステロイドのお薬を入れます	ステロイドの内服が始まります
活動・安静度	点滴中はベッド上で安静にしてください	点滴中はベッド上で安静にしてください	点滴中はベッド上で安静にしてください	
食事	朝食は食べることができます 昼食は点滴が終わってから食べます	朝食は食べることができます 昼食は点滴が終わってから食べます	朝食は食べられます 昼食は点滴が終わってから食べます	
清潔	点滴の前にシャワーに入りましょう	点滴の前にシャワーに入りましょう	点滴の前にシャワーに入りましょう	
排泄	点滴中、トイレに行きたい時は教えてください	点滴中、トイレに行きたい時は教えてください	点滴中、トイレに行きたい時は教えてください	
検温	30分ごとに、血圧測定し呼吸状態の観察を行います 血糖測定を治療開始・治療終了時・治療終了後2時間に行います	30分ごとに、血圧測定し呼吸状態の観察を行います 血糖測定を治療開始・治療終了時・治療終了後2時間に行います	30分ごとに、血圧測定し呼吸状態の観察を行います 血糖測定を治療開始・治療終了時・治療終了後2時間に行います	
患者様及びご 家族への説明 栄養指導 服薬指導	病棟の案内をします 点滴中は心電図などのモニターをつけます	点滴中は心電図などのモニターをつけます	点滴中は心電図などのモニターをつけます	
蓄尿	おしっこを専用容器におためてください	おしっこを専用容器におためてください	おしっこを専用容器におためてください	

※なにか分からないことがあれば、お尋ねください



宮崎大学医学部附属病院 4階東 小児病棟