

患者氏名:

受け持ち医師:

項目	月日 入院	(1日目)	(2~4日目)	退院 (5日目)
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 化学療法のオリエンテーションを受け理解できる 分からないことや不安などを医療者に表出し、準備が整った上で治療に臨むことができる 白血球3000以下、血小板10万以下ではない 発熱がない(38.0℃以上) 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用症状が増強した時に、対処方法をとることができ症状が緩和できる 		<ul style="list-style-type: none"> 退院後の日常生活の留意点と言える 異常を自覚した場合の対処法と言える
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ		<p>【点滴の順番】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①吐き気止め(30分) ②治療のお薬(2時間) ③治療のお薬(全開約5~10分) ④水分を流します(2時間) <p>水分を流すのは、腎臓にお薬が蓄積しないように腎臓を洗い流すためです</p> <p>計4時間40分</p> <p>翌日新たに針を刺さないで良いように針を残しておきます</p>	<p>【点滴の順番】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①吐き気止め(30分) ②水分を流します(2時間) <p>水分を流すのは、腎臓にお薬が蓄積しないように腎臓を洗い流すためです</p> <p>計2時間30分</p> 	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 入院時に採血があります 	<ul style="list-style-type: none"> ・特にありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・特にありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・採血があります
活動・安静度	<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありませんが持続点滴をしていますので、移動の際には点滴漏れに注意してください 		<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません
食事	<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・食べられるものを好きな時にとってください 		<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ・入浴できます 	<ul style="list-style-type: none"> ・治療前か後にシャワーに入ることができます。点滴の針が入っている部分にカバーをしますのでお知らせください 		<ul style="list-style-type: none"> ・入浴できます
排泄	<ul style="list-style-type: none"> ・尿の検査や尿量の測定を行いますので、入院時より、治療終了翌日まですべて蓄尿機に尿をためてください 	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄尿機に尿をためてください ・便秘の場合はご相談ください 		<ul style="list-style-type: none"> ・朝の5時まで蓄尿機に尿をためてください
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> ・入院生活のオリエンテーションを行います ・初めての治療の時には医師より説明があり、同意書を書いていただきます。看護師からも化学療法のオリエンテーションを行います。副作用の対処方法についても説明を行います 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人差もありますが、吐き気や下痢などの副作用症状が出る場合がありますので、異常を感じたらご相談ください。内服や注射や坐薬があります 	<ul style="list-style-type: none"> ・退院前に退院指導を行います ・退院後に必要な薬の希望がありましたらお知らせください 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・食事の変更ができます *例: お粥希望・パン食希望 *治療のため吐き気が出た場合には、病院の食事を欠食にすることができます ・治療のスケジュールは、1クールに2回の治療があり、その間隔が2週間と3週間になります 	<ul style="list-style-type: none"> ・点滴が漏れた場合、点滴の種類によっては皮膚炎や壊死を起こすことがあります。点滴が入っているところが痛い・赤い・腫れている・硬くなっている・機械の音が鳴るなどの場合はお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> ・4日目に退院される場合は朝6時頃より点滴を始めます 	<ul style="list-style-type: none"> ・11時退院予定です ・次の外来受診日を確認してください <p>産婦人科病棟直通 0985-85-1746</p>