

(前日入院/5日間投与)

FP療法を受ける患者さんへ

患者氏名:

主治医:

担当看護師:

月 日	／	／	／	／	／	／	／	／
項 目	入院	治療1日目	治療2日目	治療3日目	治療4日目	治療5日目	治療6日目	治療7日目/退院
達成目標	・ オリエンテーションが理解できる ・ 副作用症状について理解できる	・ 副作用症状について理解でき、症状があるときは報告できる ・ 点滴ルート刺入部に痛みや赤みがあれば報告できる ・ 尿量の測定を行うことができる						・ 副作用症状について理解でき、症状があるときは報告できる ・ 感染予防を継続できる
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置 リハビリ	・ 内服薬は全て薬剤師にお渡しください ・ 内服薬が変更または中止になることがあります ・ 点滴を行います	・ 点滴が続きます ・ 抗がん剤が開始されます ・ 吐き気がある時は、吐き気止めを使います ・ 体重の増加が多い時は、利尿剤を使うことがあります 					・ 点滴が終了します	
検査	・ 尿検査 ・ 採血 ・ 心電図 ・ 胸部、腹部レントゲン ・ 身長、体重測定	・ 起床時と15時に体重測定を行い、看護師にお知らせください				・ 起床時に体重測定を行い、看護師にお知らせください		
							・ 採血があります	
活動・安静度	・ 制限はありません	・ 制限はありません ・ 点滴を行っていますので、転倒にご注意ください						・ 制限はありません
食事	・ 制限はありません ・ 通常通り食べられます 							
清潔	・ 点滴を入れる前に入浴を済ませてください 	・ 看護師が体拭きや洗髪のお手伝いをします 					・ 点滴終了後、シャワー浴ができます	
排泄	・ 制限はありません。トイレに行けます							
		・ 尿量を測定してください ・ 排泄時は男女共に座って行ってください ・ 排泄後はトイレ内のトイレクリーナーで便座を拭いてください 						
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	・ 医師から治療の説明があります ・ 看護師が治療の副作用の説明や生活指導を行います		・ 治療による副作用症状(吐き気、食欲不振など)がありましたら、お知らせください				《退院指導》 以下の症状と対処法について説明します ・ 口内炎と味覚障害 ・ 下痢と便秘 ・ 骨髄抑制 ・ 脱毛、爪・皮膚の変化 	
	・ 点滴が入っているところに、痛みや赤みがある時はお知らせください							
	・ 輸液ポンプのアラームが鳴っている時はお知らせください							
	・ 点滴が終了したらお知らせください ・ 感染予防のため、手洗い、うがいを行ってください							

注: イラストはMPCのイラスト集より転載

宮崎大学医学部附属病院