

リツキサンを受けられる患者さんへ

患者さん用

患者氏名:

主治医:

受け持ち看護師:

項目	投与前	投与中	投与後
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 熱が37.5℃以下。 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している。 点滴の刺入部に痛みや腫れがない。 悪寒、発熱、かゆみ、動悸、頭痛、気分不良、脱力感がない。 	
 治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置	<ul style="list-style-type: none"> 点滴をする30分前にアレルギー症状を予防する薬を内服します。 点滴を始める前に、心電図のモニターを付けます。(3回目以降は必要ありません。) 点滴開始30分前に レスタミンコーワ 5錠 ピリナジン 1包を内服してください。 	<ul style="list-style-type: none"> リツキサンは副作用症状を見ながら、看護師が初めはゆっくり、だんだん早くしていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 主治医が、点滴終了後異常がないと判断したら、心電図モニターを外します。
・検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血 胸部と腹部のレントゲン 心電図室での心電図検査 		
活動・安静度		<ul style="list-style-type: none"> 点滴中はできるだけベッド上で安静にしてください。 	
食事	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません。 		
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 治療前に入浴をして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> リツキサン投与中は入浴・シャワー浴はひかえて下さい。 	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません。 		
患者様及びご家族への説明 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 点滴開始前の体温、血圧、脈拍数を測りに来ます。 アレルギー症状を緩和するお薬を飲むことで眠気がありますが、そのまま眠っていても大丈夫です。 手から点滴をしている人は、点滴部位が見やすい衣服を着て下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴が始まって15分後、30分後、60分後、90分後とその後は1時間おきに体温、血圧、脈拍数などを測りに来ます。 点滴中に発熱、寒気、かゆみ、頭痛、動悸、悪心の症状が現れた。点滴の針が入っているところが痛かったり、腫れた等のときは、ナースコールでお知らせ下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴終了後の体温、血圧、脈拍数などを測りに来ます。 

なんでも
ご相談
下さい

