



大腸ポリープ切除術(EMR)を受けられる患者さんへ

患者さん用

患者氏名：

受け持ち医師：

受け持ち看護師：

項目 \ 月日	曜日(入院日)	曜日	曜日(退院日)
達成目標	・病棟内のオリエンテーションを理解できる。 ・大腸EMR患者用パスで治療の流れを理解することが出来る。 ・術後、血便や腹痛などの異常出現時は、医療者へ報告することを知っている。	・腹痛の増強がない。 ・血便がない。 ・トイレ歩行のみの安静を守ることが出来る。 ・術後、血便や腹痛などの異常出現時は、医療者へ報告できる。	・腹痛の増強がない。 ・血便がない。 ・退院後も、血便や腹痛などの異常出現時の連絡先を知っている。
薬剤（点滴・内服） ・リハビリ	・寝る前にフォルセニド2錠(下剤)飲みます。 	・朝からガスモチンを内服し、その後に(モビブレップ・ニフレック)を内服します。 ・午前中に点滴を始めます。	・9時ごろに点滴を抜きます。
検査・処置・治療	・採血、心電図、レントゲンがあります。 		
活動・安静度	・制限はありません。	・トイレのみ歩行可能です。 	・制限はありません。
食事	・昼食、夕食は低残渣食になります。	・朝食、昼食は欠食、夕方より3分粥食になります。 	・朝食は5分粥食です。 ・退院後1週間は消化の良いものを食べて下さい。 ※刺激物(コーヒー・香辛料・アルコールなど)をさけてください。
清潔	・入浴できます。 	・検査後は、入浴できません。	・入浴はできません。 ・シャワーはできます。
排泄	・制限はありません。	・(モビブレップ・ニフレック)を飲んでから数回排便があります。その際、カスが少なくなったら、トイレからナースコールで看護師を呼んで下さい。便の確認をします。	・排便後は、ご自身で便を確認して下さい。 血便や黒色便の場合はお知らせ下さい。 
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導			＜退院後に気をつけていただくこと＞ ・退院後1週間は消化の良いものを食べて下さい。 ※刺激物(コーヒー・香辛料・アルコールなど)をさけてください。 ・入浴は出来ません。1週間はシャワー浴のみにして下さい。 ・排便後は、ご自身で便を確認して下さい。 腹痛や血便のある時は、下記の連絡先にお電話下さい。 5階東病棟：0985－85－1789
			

注：イラストはMPCのイラスト集より転載

宮崎大学医学部附属病院