

切迫早産(妊娠22週以降)で安静入院をされた患者さんへ

患者氏名：

主治医：

受け持ち看護師：

達成目標	・切迫早産の症状を理解し、お腹の張りや痛み・出血・破水感がある際には看護師に連絡できる ・1日でも長く妊娠を継続できるために、安静の必要性を理解し安静にすることができる ・感染を予防する行動が取れる。		
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ	<input type="checkbox"/> お腹の張りを抑えるために安静にします 	<input type="checkbox"/> ウテメリンの点滴をします ウテメリン : 1ml/h : 2ml/h : 3ml/h : 4ml/h <input type="checkbox"/> マグセントの点滴をします マグセント : 80ml/hで30分 以後 : 10ml/h : 15ml/h : 20ml/h	<input type="checkbox"/> 妊娠35週0日で子宮収縮抑制剤の点滴を中止にします <input type="checkbox"/> 妊娠37週0日～正期産  
検査	<input type="checkbox"/> お腹の張りや胎児の心拍モニター (CTGモニター) をつけます <input type="checkbox"/> 内診 <input type="checkbox"/> 尿の検査 <input type="checkbox"/> おりもの検査 <input type="checkbox"/> 超音波検査 <input type="checkbox"/> 採血 <input type="checkbox"/> 必要と診断された場合羊水検査を行います		
活動・安静度	<input type="checkbox"/> 4階フロアは歩けます <input type="checkbox"/> 病棟内は動けます <input type="checkbox"/> トイレと洗面所・シャワーは出来ませんがそれ以外はベッドで安静です <input type="checkbox"/> トイレと洗面所のみ歩いて構いませんが、それ以外はベッドで安静です <input type="checkbox"/> トイレのみ歩行できます <input type="checkbox"/> ベッド上で常に横になったまま過ごします		
食事	<input type="checkbox"/> 食事は、ベッドの横の椅子に座って食べます (食事の制限はありません)  <input type="checkbox"/> ベッドに横になったまま食べます		
清潔	<input type="checkbox"/> シャワー浴が出来ます <input type="checkbox"/> 毎日体拭きをします シャンプー・足浴は週に2回看護師が行います		
排泄	<input type="checkbox"/> トイレに歩けます  <input type="checkbox"/> ベッド上で行います		
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<input type="checkbox"/> 切迫早産の症状について <input type="checkbox"/> 異常がある時の報告の説明 <input type="checkbox"/> 妊娠経過に合わせて体の変化、日常生活の注意点、胎児の成長、出産に向けての準備、育児についてご説明します <input type="checkbox"/> 症状を悪化させないように膀胱炎予防と排便のコントロール <input type="checkbox"/> ウテメリンの副作用について <input type="checkbox"/> お産の物品準備について <input type="checkbox"/> マグセントの副作用について <input type="checkbox"/> 点滴管理の注意事項 <input type="checkbox"/> 蓄尿について <input type="checkbox"/> 分娩に向けてのオリエンテーション <input type="checkbox"/> 帝王切開術についてのオリエンテーション		
その他			