

ACTH療法（投与日以降）を受けられる患者さんへ

患者氏名

主治医：

受け持ち看護師：

月日	1日目～14日目	15日目～28日目	29日目～42日目	退院 43日目
項目				
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療の目的について理解することができる 	<ul style="list-style-type: none"> ACTH療法の副作用について理解し、その対処法について医療者と相談し実践することができる 感染予防行動をとることができる 		<ul style="list-style-type: none"> 退院指導について理解できる
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ	<p>持参された薬がある場合はお知らせください</p> <p>ACTH（コートロシンZ）を左右交代でおしりまたは太腿に毎日注射します</p> <p>毎日体重を測ります</p>	<p>医師に指示された薬を継続してください</p> <p>ACTH（コートロシンZ）を左右交代でおしりまたは太腿に一日おきに注射します</p> <p>医師の指示に沿って体重を測ります</p>	<p>医師に指示された薬を継続してください</p> <p>ACTH（コートロシンZ）を左右交代でおしりまたは太腿に二日おきに注射します</p> <p>医師の指示に沿って体重を測ります</p>	
検査	<p>1日目（ / ）と8日目（ / ）に採血と脳波検査があります</p>	<p>15日目（ / ）と22日目（ / ）に採血と脳波検査があります</p>	<p>29日目（ / ）と36日目（ / ）に採血と脳波検査があります</p>	<p>採血と脳波検査があります</p>
活動・安静度	制限はありません			
食事	脳波検査の日は眠らせる薬を使うためいつまでミルクを飲ませてよいか確認してください			
清潔	制限はありません 脳波検査の日は、脳波のあとに髪を洗いましょう			
排泄	おむつは手袋を着用して交換しビニール袋に入れて廃棄してください			
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> てんかん発作が起きた場合はすぐにお知らせください 全身状態の観察を行います 	<p>注射開始数日後から、不機嫌や夜間の興奮が出てくる場合があります 夜中にあやすための場所の提供や、眠剤の検討をしますので お気軽に医療者へご相談ください</p>		<ul style="list-style-type: none"> 次回受診日を説明します 退院後の注意点について説明します

この経過表は入院から退院までのおおよその経過をお知らせするものです。
諸所の理由で経過通りにいかない場合もありますことをご了承ください。