

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名（一般名）	投与量			投与スケジュール	1コースの期間（日）	催吐リスク
E-01	FP療法（80/800）	シスプラチン	80	mg/m ²		d1	21（術前） 28（術後）	高度
		フルオロウラシル	800	mg/m ²		d1-5		
E-02	FP-radiation療法 (60Gy-70/700)	シスプラチン	70	mg/m ²		d1	28	高度
		フルオロウラシル	700	mg/m ²		d1-4		
E-03	FP-radiation療法 (50.4Gy-70/700)	シスプラチン	70	mg/m ²		d1	28	高度
		フルオロウラシル	700	mg/m ²		d1-4		
E-04	CDGP+5FU療法	ネダプラチン	90	mg/m ²		d1	28	中等度
		フルオロウラシル	800	mg/m ²		d1-5		
E-05	triweekly DTX療法	ドセタキセル	70	mg/m ²		d1	21	軽度
E-06	weekly PTX療法	パクリタキセル*	100	mg/m ²		d1,8,15,22,29,36	49	軽度
E-07	DCF療法（術前）	フルオロウラシル	750	mg/m ²		d1-5	21	高度
		ドセタキセル	70	mg/m ²	d1			
		シスプラチン	70	mg/m ²				
E-08	DCF療法（30-80-800）	フルオロウラシル	800	mg/m ²		d1-5	28	高度 (d15: 軽度)
		ドセタキセル	30	mg/m ²		d1,15		
		シスプラチン	80	mg/m ²		d1		
E-09	ニボルマブ療法	ニボルマブ	240	mg/body		d1	14	最小度

*添付文書に従い、前投薬を使用