

非小細胞肺癌

| レジメン番号 | レジメン名称 | 薬剤名 (一般名) | 投与量 | | 投与スケジュール | 1コースの期間 (日) | 催吐リスク | | | | | |
|--------|------------------------|-----------------------------|------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|------|----|----|-----|
| Lu-01 | CBDCA (d1) +GEM療法 | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | d1,8 | 21 | d1: 中等度(オプショ) d8: 軽度 | | | | | |
| | | カルボプラチン | 5 | AUC | d1 | | | | | | | |
| Lu-02 | CBDCA+PTX (d1,8,15) 療法 | パクリタキセル* | 70 | mg/m ² | d1,8,15 | 28 | d1: 中等度(オプショ) d8,15: 軽度 | | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | d1 | | | | | | | |
| Lu-03 | CBDCA+PTX (d1) 療法 | パクリタキセル* | 200 | mg/m ² | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | | | | | | | | |
| Lu-04 | CDDP+DTX療法 | ドセタキセル | 60 | mg/m ² | d1 | 21 | 高度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | | | | | | | | |
| Lu-05 | CDDP+GEM療法 | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | d1,8 | 21 | d1: 高度 d8: 軽度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | d1 | | | | | | | |
| Lu-06 | CDDP+VNR療法 | ビノレルピン | 25 | mg/m ² | d1,8 | 21 | d1: 高度 d8: 最小度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | d1 | | | | | | | |
| Lu-07 | DTX療法 | ドセタキセル | 60 | mg/m ² | d1 | 21 | 軽度 | | | | | |
| Lu-08 | weekly PTX療法 | パクリタキセル* | 80 | mg/m ² | d1,8,15 | 28 | 軽度 | | | | | |
| Lu-14 | CBDCA (d8) +GEM療法 | カルボプラチン | 5 | AUC | d8 | 28 | d1: 軽度 d8: 中等度(オプショ) | | | | | |
| | | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | d1,8 | | | | | | | |
| Lu-17 | CDDP+PTX療法 | パクリタキセル* | 70 | mg/m ² | d1,8,15 | 28 | d1: 高度 d8,15: 軽度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | d1 | | | | | | | |
| Lu-18 | CDDP+ベメトレキセド療法 | ベメトレキセド** | 500 | mg/m ² | d1 | 21 | 高度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 75 | mg/m ² | | | | | | | | |
| Lu-19 | CBDCA+DTX+TRT療法 | パクリタキセル* | 35 | mg/m ² | d1,8,15,22,29,36 | 42 | 中等度 | | | | | |
| | | カルボプラチン | 2 | AUC | | | | | | | | |
| Lu-20 | CBDCA+PTX +ベバシズマブ療法 | パクリタキセル* | 200 | mg/m ² | 4-6コース | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | | | | | | | | |
| | | ベバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | | | | | |
| | | ベバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | | 維持療法 | d1 | 21 | 最小度 |
| Lu-21 | ベメトレキセド療法 | ベメトレキセド** | 500 | mg/m ² | d1 | 21 | 軽度 | | | | | |
| Lu-22 | ベバシズマブ療法 | ベバシズマブ | 15 | mg/kg | d1 | 21 | 最小度 | | | | | |
| Lu-24 | CBDCA+ベメトレキセド療法 | ベメトレキセド** | 500 | mg/m ² | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | | |
| | | カルボプラチン | 5 | AUC | | | | | | | | |
| Lu-25 | CDDP+DTX+RT療法 | ドセタキセル | 40 | mg/m ² | d1,8,29,36 | 56 | 高度 | | | | | |
| | | シスプラチン | 40 | mg/m ² | | | | | | | | |
| Lu-26 | CBDCA+DTX療法 | ドセタキセル | 75 | mg/m ² | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | | | | | | | | |
| Lu-27 | CBDCA+Pem+Bev療法 | ベメトレキセド** | 500 | mg/m ² | 1-6コース | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | | | | | | | | |
| | | ベバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | | | | | |
| | | ベメトレキセド** | 500 | mg/m ² | | | | | 維持療法 | d1 | 21 | 軽度 |
| | | ベバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | | | | | |
| Lu-28 | CBDCA+S-1療法 | カルボプラチン | 5 | AUC | d1 | 21 | 中等度(オプショ) | | | | | |
| | | テガフル、ギメラシル、 オテラシルカリウム配合剤 | 40 | mg/回 (1日2回) | | | | BSA : 1.25m ² 未満 | | | | |
| | | | 50 | | | | | BSA : 1.25-1.5m ² | | | | |
| | | | 60 | | | | | BSA : 1.5m ² 以上 | | | | |
| Lu-29 | CDDP+S-1療法 | シスプラチン | 60 | mg/m ² | d8 | 35 | 高度 | | | | | |
| | | テガフル、ギメラシル、 オテラシルカリウム配合剤 | 40 | mg/回 (1日2回) | | | | BSA : 1.25m ² 未満 | | | | |
| | | | 50 | | | | | BSA : 1.25-1.5m ² | | | | |
| | | | 60 | | | | | BSA : 1.5m ² 以上 | | | | |
| Lu-30 | CBDCA+nab-PTX療法 | パクリタキセル (アルブミン懸濁型) | 100 | mg/m ² | d1,8,15 | 21 | d1: 中等度(オプショ) d8,15: 軽度 | | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | d1 | | | | | | | |

*添付文書に従い、前投薬を使用

**添付文書に従い、葉酸、ビタミンB12を投与

| レジメン番号 | レジメン名称 | 薬剤名 (一般名) | 投与量 | | 投与スケジュール | 1コースの期間 (日) | 催吐リスク | |
|--------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-------|----------------------------|
| Lu-31 | ニボルマブ療法 | ニボルマブ | 240 | mg/body | | d1 | 14 | 最小度 |
| Lu-32 | ベムプロリズマブ療法 | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | | d1 | 21 | 最小度 |
| Lu-33 | ベムプロリズマブ +CDDP+PEM療法 | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 1-4コース | d1 | 21 | 高度 |
| | | ペメトレキセド** | 500 | mg/m ² | | | | |
| | | シスプラチン | 75 | mg/m ² | | | | |
| | | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 5コース以降 | d1 | 21 | 軽度 |
| | | ペメトレキセド** | 500 | mg/m ² | | | | |
| Lu-34 | ベムプロリズマブ +CBDCA+PEM療法 | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 1-4コース | d1 | 21 | 中等度(オプショ) |
| | | ペメトレキセド** | 500 | mg/m ² | | | | |
| | | カルボプラチン | 5 | AUC | | | | |
| | | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 5コース以降 | d1 | 21 | 軽度 |
| | | ペメトレキセド** | 500 | mg/m ² | | | | |
| Lu-35 | ベムプロリズマブ +CBDCA+nab-PTX療法 | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 1-4コース | d1 | 21 | d1: 中等度(オプショ) d8,15: 軽度 |
| | | バクリタキセル (アルブミン懸濁型) | 100 | mg/m ² | | d1,8,15 | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | | d1 | | |
| | | ベムプロリズマブ | 200 | mg/body | 5コース以降 | d1 | 21 | 最小度 |
| | | Lu-36 | アテゾリズマブ療法 | アテゾリズマブ | 1200 | mg/body | | d1 |
| Lu-37 | アテゾリズマブ +CBDCA+PTX+Bev療法 | アテゾリズマブ | 1200 | mg/body | 導入療法 (4または6コース) | d1 | 21 | 中等度(オプショ) |
| | | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | |
| | | バクリタキセル* | 200 | mg/m ² | | | | |
| | | カルボプラチン | 6 | AUC | 維持療法 | d1 | 21 | 軽度 (制吐剤なし) |
| | | アテゾリズマブ | 1200 | mg/body | | | | |
| | | ペバシズマブ | 15 | mg/kg | | | | |
| Lu-39 | デュルバルマブ療法 | デュルバルマブ | 10 | mg/kg | | d1 | 14 | 最小度 |

*添付文書に従い、前投薬を使用

**添付文書に従い、葉酸、ビタミンB12を投与

小細胞肺癌

| レジメン番号 | レジメン名称 | 薬剤名 (一般名) | 投与量 | | | 投与スケジュール | 1コースの期間 (日) | 催吐リスク |
|--------|----------------|-----------|-----|-------------------|--|----------|-------------|-------------------------------|
| Lu-09 | AMR療法 | アムルピシン | 40 | mg/m ² | | d1-3 | 21 | 中等度 |
| Lu-10 | CDDP+CPT-11療法 | イリノテカン | 60 | mg/m ² | | d1,8,15 | 28 | d1: 高度 d8,15: 中等度 |
| | | シスプラチン | 60 | mg/m ² | | d1 | | |
| Lu-11 | CDDP+VP-16療法 | エトボシド | 100 | mg/m ² | | d1-3 | 28 | 高度 |
| | | シスプラチン | 80 | mg/m ² | | d1 | | |
| Lu-12 | CBDCA+CPT-11療法 | カルボプラチン | 5 | AUC | | d1 | 28 | d1: 中等度 (オプション) d8,15: 中等度 |
| | | イリノテカン | 50 | mg/m ² | | d1,8,15 | | |
| Lu-13 | CBDCA+VP-16療法 | カルボプラチン | 5 | AUC | | d1 | 28 | 中等度(オプション) |
| | | エトボシド | 80 | mg/m ² | | d1-3 | | |
| Lu-38 | ノギテカン療法 | ノギテカン | 1 | mg/m ² | | d1-5 | 21 | 軽度 |

悪性中皮腫

| レジメン番号 | レジメン名称 | 薬剤名 (一般名) | 投与量 | | | 投与スケジュール | 1コースの期間 (日) | 催吐リスク |
|--------|-------------|-----------|------|-------------------|--|----------|-------------|------------------------------|
| Lu-23 | CBDCA+GEM療法 | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | | d1,8,15 | 28 | d1: 中等度 (オプション) d8,15: 軽度 |
| | | カルボプラチン | 5 | AUC | | d1 | | |