

悪性黒色腫

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名（一般名）	投与量			投与スケジュール	1コースの期間（日）	催吐リスク
De-08	DTIC療法	ダカルバジン	1000	mg/m ²		d1	21-28	高度
De-22	ニボルマブ療法①	ニボルマブ	240	mg/body		d1	14	最小度
	ニボルマブ療法②	ニボルマブ	480	mg/body		d1	28	最小度
De-23	イビリムマブ療法	イビリムマブ	3	mg/kg		d1	21	最小度
De-24	ニボルマブ + イビリムマブ療法	ニボルマブ	80	mg/body	1-4コース	d1	21	最小度
		イビリムマブ	3	mg/kg				
		ニボルマブ	240	mg/body	5コース目以降	d1	14	最小度

成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）、末梢性T細胞リンパ腫（PTCL）、皮膚T細胞性リンパ腫（CTCL）

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名（一般名）	投与量			投与スケジュール	1コースの期間（日）	催吐リスク
De-20	モガムリズマブ療法	モガムリズマブ*	1	mg/kg		d1	7	最小度

*添付文書に従い、前投薬を使用

その他

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名（一般名）	投与量			投与スケジュール	1コースの期間（日）	催吐リスク
De-06	DTX療法 （乳房外パージェット病）	ドセタキセル	60	mg/m ²		d1	21	軽度
De-09	CPT-11療法 （皮膚有棘細胞癌）	イリノテカン	100	mg/m ²		d1,8,15	28	中等度
De-12	weekly PTX療法 （血管肉腫）	パクリタキセル*	80	mg/m ²		d1,8,15	28	軽度
De-14	FP（70/700）+ RT療法 （皮膚扁平上皮癌/有棘細胞癌）	シスプラチン	70	mg/m ²		d1	28	高度
		フルオロウラシル	700	mg/m ²		d1-5		

*添付文書に従い、前投薬を使用