

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク	
P-01	GEM単独療法	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d1,8,15	28日間	軽度	
P-05	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	14日間	高度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	d1			
		イリノテカン	180 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1 (46時間)			
P-06	GEM+nab-PTX療法	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	d1,8,15	28日間	中等度 (steroid sparing)	
		ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d1,8,15			
P-07	modified FOLFIRINOX (mFFX) 療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1	14日間	高度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	d1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1 (46時間)			
P-08	NAC-GS療法	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	d1,8	21日間	軽度	
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.25m ² 未満			d1-14
			50 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.25-1.5m ²			
			60 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.5m ² 以上			
P-09	nal-IRI+5-FU/LV療法	イリノテカン (リボソーム製剤)	50 mg/m ²	d1	14日間	中等度 (steroid sparing)	
		レボホリナート	200 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1 (46時間)			