

泌尿器腫瘍（尿路上皮癌）

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
Uro-05	GC療法（q4w）	ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>		d1,8,15	28日間	軽度
		シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>		d2		高度
Uro-06	GC療法（q3w）	ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>		d1,8	21日間	軽度
		シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>		d2		高度
Uro-13	エピルピシン膀胱療法	エピルピシン	30 mg/body	膀胱内注入	d1		
Uro-14	ピラルピシン膀胱療法	ピラルピシン	30 mg/body	膀胱内注入	d1		
Uro-22	GCarbo療法	ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>		d1,8	21日間	軽度
		カルボプラチン	4 AUC	max : 600mg	d1		中等度(オプショ)
Uro-28	Pembrolizumab単独療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	最小度
Uro-36	Avelumab単独療法	アベルマブ*	10 mg/kg		d1	14日間	最小度
Uro-37	Enfortumab Vedotin療法	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	max : 125mg	d1,8,15	28日間	軽度

\*添付文書に従い、前投薬を使用