

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク		
Ga-01	S-1+CDDP療法	シスプラチン	60 mg/m ²		d8	35日間	高度	
			40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満				
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 以上-1.5m ² 未満	d1-21			
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上				
Ga-02	CPT-11単独療法	イリノテカン	150 mg/m ²		d1,15	28日間	中等度	
Ga-05	triweekly DTX療法	ドセタキセル	60 mg/m ²		d1	21日間	軽度	
Ga-06	S-1+DTX療法	ドセタキセル	40 mg/m ²		d1	21日間	軽度	
			40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満				
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 以上-1.5m ² 未満	d1-14			
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上				
Ga-07	weekly PTX療法	パクリタキセル*	80 mg/m ²		d1,8,15	28日間	軽度	
Ga-10	XP±Trastuzumab療法	トラスツマブ	8 mg/kg	初回		21日間	高度	
			6 mg/kg	2回目以降	d1			
		シスプラチン	80 mg/m ²		d1			
			1200 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.36m ² 未満				
		カベシタピン	1500 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.36m ² 以上-1.66m ² 未満				d1-14
			1800 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.66m ² 以上-1.96m ² 未満				
	2100 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.96m ² 以上						
Ga-12	SOX療法	オキサリプラチン	100 mg/m ²		d1	21日間	中等度	
			40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満				
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 以上-1.5m ² 未満	d1-14			
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上				
Ga-13	Ramucirumab単独療法	ラムシルマブ*	8 mg/kg		d1	14日間	最小度	

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク	
Ga-14	Ramucirumab+PTX療法	ラムシルマブ*	8 mg/kg	d1,15	28日間	軽度	
		パクリタキセル*	80 mg/m ²	d1,8,15			
Ga-15	Nivolumab単独療法①	ニボルマブ	240 mg/body	d1	14日間	最小度	
	Nivolumab単独療法②	ニボルマブ	480 mg/body	d1	28日間	最小度	
Ga-17	mFOLFOX6療法	レボホリナート	200 mg/m ²	d1	14日間	中等度	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	d1			
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	d1(46時間)			
Ga-19	XELOX (CapeOX) 療法	オキサリプラチン	130 mg/m ²	d1	21日間	中等度(オプション)	
		カペシタピン	1200 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.36m ² 未満			d1-14
			1500 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.36m ² 以上-1.66m ² 未満			
			1800 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.66m ² 以上-1.96m ² 未満			
			2100 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.96m ² 以上			
Ga-20	nab-PTX+RAM療法	ラムシルマブ*	8 mg/kg	d1,15	28日間	軽度	
		アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	d1,8,15			
Ga-21	SOX+Trastuzumab療法	トラスツズマブ	8 mg/kg	初回	21日間	中等度	
			6 mg/kg	2回目以降			
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	d1			
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.25m ² 未満			d1-14
			50 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.25m ² 以上-1.5m ² 未満			
	60 mg/回 (朝夕食後)	BSA : 1.5m ² 以上					

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク			
Ga-22	S-1+CDDP +Trastuzumab療法	トラスツズマブ	8 mg/kg	初回	d1	21日間	最小度		
			6 mg/kg	2回目以降					
		シスプラチン	60 mg/m ²		d8				
		テガフルム・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満	d1-21			35日間	高度
			50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 以上-1.5m ² 未満					
		60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上						
Ga-23	5-FU/l-LV療法	レボホリナート	250 mg/m ²		d 1,8,15,22,29,36	56日間	軽度		
		フルオロウラシル	600 mg/m ²		d 1,8,15,22,29,36				
Ga-24	Trastuzumab Deruxtecan 単独療法	トラスツズマブ テルクステカン	6.4 mg/kg		d1	21日間	中等度		
Ga-25	FTD/TPI +Ramucirumab療法	ラムシルマブ	8 mg/kg		d1,15	28日間	最小度 (FTD/TPI：中等度)		
			35 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.07m ² 未満					
		40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.07m ² 以上～1.23m ² 未満						
		45 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.23m ² 以上～1.38m ² 未満						
		50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.38m ² 以上～1.53m ² 未満						
		トリフルリジン ・チピラシル配合錠	55 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.53m ² 以上～1.69m ² 未満	d1-5 d8-12				
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.69m ² 以上～1.84m ² 未満					
			65 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.84m ² 以上～1.99m ² 未満					
			70 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.99m ² 以上～2.15m ² 未満					
			75 mg/回（朝夕食後）	BSA：2.15m ² 以上					

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク		
Ga-26	Nivolumab+SOX療法	ニボルマブ	360 mg/body		d1	21日間	中等度	
		オキサリプラチン	130 mg/m ²		d1			
			40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満				
		テガフル、ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 以上-1.5m ² 未満	d1-14			
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上				
Ga-27	Nivolumab +XELOX（CapeOX）療法	ニボルマブ	360 mg/body		d1	21日間	中等度(オプション)	
		オキサリプラチン	130 mg/m ²		d1			
			1200 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.36m ² 未満				
		カベシタピン	1500 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.36m ² 以上-1.66m ² 未満	d1-14			
			1800 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.66m ² 以上-1.96m ² 未満				
		2100 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.96m ² 以上					
Ga-28	Nivolumab+FOLFOX療法	ニボルマブ	240 mg/body		d1	14日間	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²		d1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²		d1			
		フルオロウラシル	400 mg/m ²		d1			
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1(46時間)			

*添付文書に従い、前投薬を使用