レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
B-07	Vinorelbine療法	ビノレルビン	25 mg/m²		d1,8	21日間	最小度
B-10	triweekly Trastuzumab療法	トラスツズマブ	8 mg/kg	初回	d1	21日間	最小度
B-11			6 mg/kg	2回目以降	ŭ i		
B-12	EC療法	エピルビシン	90 mg/m²		d1	- 21日間	高度(steroid sparing)
5 12		シクロホスファミド	600 mg/m²		d1		
B-13	AC療法	ドキソルビシン	60 mg/m²		d1	- 21日間	高度(steroid sparing)
D 10		シクロホスファミド	600 mg/m²		d1		
B-19	DTX+CPA療法	ドセタキセル	75 mg/m²		d1	- 21日間	中等度
D 10		シクロホスファミド	600 mg/m²		d1		
B-20	Eribulin療法	エリブリン	1.4 mg/m²		d1,8	21日間	軽度
	Pertuzumab +Trastuzumab+DTX療法	ペルツズマブ	840 mg/body	初回	— d1	- 21日間 -	軽度
			420 mg/body	2回目以降			
B-23		トラスツズマブ	8 mg/kg	初回	d1		
			6 mg/kg	2回目以降			
		ドセタキセル	75 mg/m²		d1		
B-24	PTX+Bev療法	ベバシズマブ	10 mg/kg		d1,15	— 28日間	軽度
D 24		パクリタキセル*	90 mg/m²		d1,8,15		
B-26	T-DM1療法	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg		d1	21日間	軽度
	ddAC療法	ドキソルビシン	60 mg/m²		d1		高度(steroid sparing)
B-27		シクロホスファミド	600 mg/m²		d1	14日間	
		ペグフィルグラスチム	3.6 mg/0		d2		
B-28	ddPTX療法	パクリタキセル*	175 mg/m²		d1	- 14日間	軽度
J 20		ペグフィルグラスチム	3,6 mg/0		d2		

レジメン番号	レジメン名称	業品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
B-29	Atezolizumab +nab-PTX療法	アテゾリズマブ	840 mg/body		d1,15	28日間	軽度
		アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m²		d1,8,15		
B-30	ddEC療法	エピルビシン	90 mg/m²		d1	14日間	高度(steroid sparing)
		シクロホスファミド	600 mg/m²		d1		
		ペグフィルグラスチム	3.6 mg/0		d2		
B-31	Trastuzumab Deruxtecan療法	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg		d1	21日間	中等度
B-32	Pertuzumab+Trastuzumab +Paclitaxel療法	ペルツズマブ -	840 mg/body	初回	d1	· 21日間	軽度
			420 mg/body	2回目以降	<u> </u>		
		トラスツズマブ -	8 mg/kg	初回	d1		
			6 mg/kg	2回目以降	<u> </u>		
		パクリタキセル*	80 mg/m²		d1,8,15		
	Pembrolizumab+GEM +CBDCA療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		d1	- 21日間	中等度
B-33		ゲムシタビン	1000 mg/m²		d1,8		
		カルボプラチン	2 AUC		d1,8		
B-34	Pembrolizumab+PTX療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	最小度
		パクリタキセル*	90 mg/m²		d1,8,15	28日間	軽度
B-35	Pembrolizumab+nab-PTX療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	最小度
		アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m²		d1,8,15	28日間	軽度

\*添付文書に従い、前投薬を使用