

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク	
Uro-19	Temsirolimus療法	テムシロリムス*	25 mg/body		d1	7日間	最小度
Uro-30	Ipilimumab+Nivolumab併用療法①	ニボルマブ	240 mg/body	1-4コース	d1	21日間	最小度
		イピリムマブ	1 mg/kg	1-4コース	d1		
Uro-32	Pembrolizumab+Axitinib療法	ニボルマブ	240 mg/body	5コース目以降	d1	14日間	最小度
		イピリムマブ	240 mg/body	5コース目以降	d1		
Uro-32	Pembrolizumab+Axitinib療法	ペムプロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	最小度
		アキシチニブ	5 mg/回	1日2回経口投与	d1-21（連日投与）		軽度
Uro-34	Avelumab+Axitinib療法	アベルマブ*	10 mg/kg		d1	14日間	最小度
		アキシチニブ	5 mg/回	1日2回経口投与	d1-14（連日投与）		軽度
Uro-35	Nivolumab単独療法①	ニボルマブ	240 mg/body		d1	14日間	最小度
	Nivolumab単独療法②	ニボルマブ	480 mg/body		d1	28日間	最小度
Uro-38	Pembrolizumab+Lenvatinib療法	ペムプロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	最小度
		レンバチニブ	20 mg/回	1日1回経口投与	d1-21（連日投与）		中等度
Uro-40	Nivolumab+Cabozantinib療法	ニボルマブ	240 mg/body		d1	14日間	最小度
		カボザンチニブ	40 mg/回	1日1回経口投与	d1-14（連日投与）		軽度

*添付文書に従い、前投薬を使用