

泌尿器腫瘍（尿路上皮癌）

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
Uro-05	GC療法（q4w）	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		28日間	軽度
		シスプラチン	70 mg/m ²	d1,8,15 d2		高度
Uro-06	GC療法（q3w）	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		21日間	軽度
		シスプラチン	70 mg/m ²	d1,8 d2		高度
Uro-13	エビルピシン膀胱療法	エビルピシン	30 mg/body	膀胱内注入		d1
Uro-14	ビラルピシン膀胱療法	ビラルピシン	30 mg/body	膀胱内注入		d1
Uro-22	GCarbo療法	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		21日間	軽度
		カルボプラチン	4 AUC	max : 600mg		d1
Uro-28	Pembrolizumab単独療法	ペムプロリズマブ	200 mg/body			d1 21日間 最小度
Uro-36	Avelumab単独療法	アベルマブ*	10 mg/kg			d1 14日間 最小度
Uro-37	Enfortumab Vedotin療法	エンホルツマブ ヘドチン	1.25 mg/kg	max : 125mg		d1,8,15 28日間 軽度
Uro-39	Nivolumab単独療法	ニボルマブ	240 mg/body	術後補助療法（12ヵ月間）		d1 14日間 最小度

*添付文書に従い、前投薬を使用