

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
GB-01	Gemcitabine療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d 1,8,15	28日間	デキサメタゾン注6.6mg	軽度
GB-03	GEM+CDDP療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d1,8	21日間	グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	中等度
		シスプラチン	25 mg/m ²		d 1,8			
GB-04	GCS療法 (GEM+CDDP+S-1)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d1	14日間	グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	中等度
		シスプラチン	25 mg/m ²		d1			
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満	d 1-7			
			50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25-1.5m ²				
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上				
GB-05	Durvalumab+GC療法 (1-8コース)	デュルバルマブ	1500 mg/body		d1	21日間	グラニセトロン注3mg デキサメタゾン注6.6mg	中等度
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d 1,8			
		シスプラチン	25 mg/m ²		d1,8			
		Durvalumab+GC療法 (9コース以降)	デュルバルマブ	1500 mg/body		d1	28日間	-