

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク	
P-01	Gemcitabine療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d1,8,15	28日間	デキサメタゾン注6.6mg	軽度	
P-06	GEM+nab-PTX療法	パクリタキセル （アルブミン懸濁型）	125 mg/m ²		d1,8,15	28日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注6.6mg	中等度	
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d1,8,15				
P-07	modified FOLFIRINOX （mFFX）療法	オキサリプラチン	85 mg/m ²		d 1	14日間	ホスネツピタント注235mg（day1） パロノセトロン注0.75mg（day1） デキサメタゾン注9.9mg（day1） デキサメタゾン錠8mg（day2-4）	高度	
		レボホリナート	200 mg/m ²		d1				
		イリノテカン	150 mg/m ²		d1				
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d 1（46時間）				
P-08	NAC-GS療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		d1,8	21日間	デキサメタゾン注6.6mg	軽度	
		テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25m ² 未満	d 1-14				
			50 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.25-1.5m ²					
			60 mg/回（朝夕食後）	BSA：1.5m ² 以上					
P-09	naI-IRI+5-FU/LV療法	イリノテカン （リボソーム製剤）	70 mg/m ²	（注1）	d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度	
			50 mg/m ²						
		レボホリナート	200 mg/m ²		d1				
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d 1（46時間）				

(注1) ①UGT1A1＊6若しくはUGT1A1＊28のホモ接合体を有する患者 ②UGT1A1＊6及びUGT1A1＊28のヘテロ接合体を有する患者