

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-02	①mFOLFOX6療法 ②mFOLFOX6+Bevacizumab療法	ペバシズマブ	5 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		オキサリプラチン	85 mg/m ²					
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
Co-03	①FOLFIRI療法 ②FOLFIRI+Bevacizumab療法	ペバシズマブ	5 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		イリノテカン	150 mg/m ²					
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
Co-05	Cetuximab単独療法①	セツキシマブ	400 mg/m ²	初回	d1	7日間	デキサメタゾン注6.6mg クロルフェニラミン注5mg	最小度
			250 mg/m ²	2回目以降				
	Cetuximab単独療法②	セツキシマブ	500 mg/m ²		d1	14日間	デキサメタゾン注6.6mg クロルフェニラミン注5mg	最小度
Co-06	sLV5-FU2療法	レボホリナート	200 mg/m ²		d1	14日間	デキサメタゾン注6.6mg	軽度
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
Co-12	Panitumumab療法	パニツムマブ	6 mg/kg		d1	14日間	-	最小度

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-13	①XELOX療法 ②XELOX+Bevacizumab療法	ペバシズマブ	7.5 mg/kg		d1	21日間	ホスネツピタント注235mg パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注4.95mg	中等度
		オキサリプラチン	130 mg/m ²					
		カペシタビン	1200 mg/回（1日2回）	1.36m ² 未満	d1-14			
			1500 mg/回（1日2回）	1.36m ² 以上－1.66m ² 未満				
			1800 mg/回（1日2回）	1.66m ² 以上－1.96m ² 未満				
			2100 mg/回（1日2回）	1.96m ² 以上				
Co-14	FOLFIRI+Panitumumab療法	パニツムマブ	6 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		イリノテカン	150 mg/m ²					
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
		Co-15	mFOLFOX6+Panitumumab療法	パニツムマブ	6 mg/kg			
レボホリナート	200 mg/m ²							
オキサリプラチン	85 mg/m ²							
フルオロウラシル	400 mg/m ²							
フルオロウラシル	2400 mg/m ²			d1（46時間）				

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-16	IRIS療法	イリノテカン	125 mg/m ²		d1,15	28日間	グラニセトロン注3mg（day1, 15） デキサメタゾン注9.9mg（day1, 15） デキサメタゾン錠8mg（day2-3, 16-17）	中等度
		テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回（1日2回）	BSA：1.25m ² 未満	d1-14			
			50 mg/回（1日2回）	BSA：1.25-1.5m ²				
			60 mg/回（1日2回）	BSA：1.5m ² 以上				
Co-17	SOX+Bevacizumab療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg		d1	21日間	グラニセトロン注3mg（day1） デキサメタゾン注9.9mg（day1） デキサメタゾン錠8mg（day2-3）	中等度
		オキサリプラチン	130 mg/m ²		d1-14			
		テガフル, ギメラシル, オテラシルカリウム配合剤	40 mg/回（1日2回）	BSA：1.25m ² 未満				
			50 mg/回（1日2回）	BSA：1.25-1.5m ²				
			60 mg/回（1日2回）	BSA：1.5m ² 以上				
Co-20	FOLFOXIRI+Bevacizumab療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		d1	14日間	アプレピタントカプセル125mg/80mg パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg デキサメタゾン錠8mg（day2-4）	高度
		イリノテカン	165 mg/m ²					
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		オキサリプラチン	85 mg/m ²					
		フルオロウラシル	3200 mg/m ²		d1（46時間）			

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-21	FOLFIRI+Ramucirumab療法	ラムシルマブ	8 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg クロルフェニラミン注5mg	中等度
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		イリノテカン	150 mg/m ²					
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
Co-22	FTD/TPI+Bevacizumab療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		d1,15	28日間	-	最小度
		トリフルリジン ・チピラシル配合錠	35 mg/回（1日2回）	BSA：1.07m ² 未満	d1-5 d8-12			中等度
			40 mg/回（1日2回）	BSA：1.07m ² 以上～1.23m ² 未満				
			45 mg/回（1日2回）	BSA：1.23m ² 以上～1.38m ² 未満				
			50 mg/回（1日2回）	BSA：1.38m ² 以上～1.53m ² 未満				
			55 mg/回（1日2回）	BSA：1.53m ² 以上～1.69m ² 未満				
			60 mg/回（1日2回）	BSA：1.69m ² 以上～1.84m ² 未満				
			65 mg/回（1日2回）	BSA：1.84m ² 以上～1.99m ² 未満				
			70 mg/回（1日2回）	BSA：1.99m ² 以上～2.15m ² 未満				
			75 mg/回（1日2回）	BSA：2.15m ² 以上				

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-23	FOLFIRI+Aflibercept療法	アフリベルセプト	4 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		イリノテカン	150 mg/m ²					
		フルオロウラシル	400 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²		d1（46時間）			
Co-24	XELIRI+Bevacizumab療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg		d1	21日間	アプレピタントカプセル125mg/80mg パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注4.95mg	中等度
		イリノテカン	200 mg/m ²					
		カペシタピン	900 mg/回（1日2回）	1.31m ² 未満	d1-14			
			1200 mg/回（1日2回）	1.31m ² 以上－1.69m ² 未満				
			1500 mg/回（1日2回）	1.69m ² 以上－2.07m ² 未満				
			1800 mg/回（1日2回）	2.07m ² 以上				
Co-25	Nivolumab単独療法①	ニボルマブ	240 mg/body		d1	14日間	-	最小度
	Nivolumab単独療法②	ニボルマブ	480 mg/body		d1	28日間	-	最小度
Co-26	Nivolumab+Ipilimumab療法 （1-4コース）	ニボルマブ	240 mg/body		d1	21日間	-	最小度
		イピリムマブ	1 mg/kg					
	Nivolumab+Ipilimumab療法 （5コース目以降①）	ニボルマブ	240 mg/body		d1	14日間	-	最小度
		Nivolumab+Ipilimumab療法 （5コース目以降②）	ニボルマブ	480 mg/body				

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量		投与スケジュール	1コースの期間	制吐療法・前投薬	催吐リスク
Co-27	CPT-11+Panitumumab療法	パニツムマブ	6 mg/kg		d1	14日間	パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg	中等度
		イリノテカン	150 mg/m ²		d1			
Co-28	FOLFOXIRI+Panitumumab療法	パニツムマブ	6 mg/kg		d1	14日間	アプレピタントカプセル125mg/80mg パロノセトロン注0.75mg デキサメタゾン注9.9mg デキサメタゾン錠8mg（day2-4）	高度
		イリノテカン	150 mg/m ²					
		オキサリプラチン	85 mg/m ²					
		レボホリナート	200 mg/m ²					
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²					
Co-29	Cetuximab+Encorafenib +Binimetinib療法（1コース目）	セツキシマブ	400 mg/m ²		d1	7日間	デキサメタゾン注6.6mg クロルフェニラミン注5mg	最小度
		エンコラフェニブ	300 mg/回	1日1回経口投与	d1-7（連日）			中等度
		ビニメチニブ	45 mg/回	1日2回経口投与	d1-7（連日）			中等度
	Cetuximab+Encorafenib +Binimetinib療法（2コース目以降）	セツキシマブ	250 mg/m ²		d1	7日間	デキサメタゾン注6.6mg クロルフェニラミン注5mg	最小度
		エンコラフェニブ	300 mg/回	1日1回経口投与	d1-7（連日）			中等度
		ビニメチニブ	45 mg/回	1日2回経口投与	d1-7（連日）			中等度
Co-30	Pertuzumab+Trastuzumab療法 （1コース目）	ペルツズマブ	840 mg/body		d1	21日間	-	最小度
		トラスツズマブ	8 mg/kg					
	Pertuzumab+Trastuzumab療法 （2コース目以降）	ペルツズマブ	420 mg/body		d1	21日間	-	最小度
		トラスツズマブ	6 mg/kg					
Co-31	Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body		d1	21日間	-	最小度