（作成者：クリニカルパス専門部会）

冠動脈化学塞栓術（TACE）を受けられる患者さんへ（消内）

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	1病日 ／ 治療1日前	2病日 ／ 治療当日（治療前）	2病日 ／ 治療当日（治療後）	3病日 ／ 治療後1日目	4病日 ／ 治療後2日目	5～7病日 ／ 治療後3～5日目	8病日 ／ 治療後6日目	9病日：退院 ／ 治療後7日目	【退院後の生活について】
評価	・治療について理解できる		・創部の出血がない				・退院指導の内容を理解できる		・定期的な通院を継続してください ・処方されている薬は、自己判断せずに医師の指示通りに内服してください ・肝臓病では飲酒が病気を重症化させます。禁酒を心掛けてください ・緩下剤であるラクツロースを内服し、毎日排便があるよう飲む量を調節してください ・入院生活で下肢筋力が低下していますので、歩行時はゆっくり動き、転倒に注意してください 以下の症状がある時はご連絡ください ・吐き気があり食欲がない ・腹痛 ・黒っぽい便がでる ・むくみ（手足、背中など）が出てきた、体重が増えた ・肌や目が黄色くなった ・手が震えたり、意識がはっきりせず、会話・行動・書字がいつもと違う ・吐血 【緊急連絡先】 ・診療日時間内（8：30～17：00） 内科外来 0985-85-9883 ・休診日・診療日時間外 3階西病棟 0985-85-1745 
			・発熱時は解熱剤で対処できる						
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します								
治療		血管造影室で治療します							
注射		・8時前に点滴をします			・点滴を抜きます				
検査	・採血 ・尿検査 ・レントゲン ・心電図 ・身長・体重測定			・採血		・採血 （治療後3日目）	・採血	・体重測定	
処置	・両足の甲に、治療後の血流確認のための印をつけます ・両足の付け根の部分を除毛します	・緊張と痛みを和らげる注射をします							
		・尿の管を入れます	・安静解除後に尿の管を抜きます						
			・帰室4時間後、医師が診察し、創部の消毒をします	・創部を確認し、必要時は消毒をします					
食事	・夕食後は、指示された時間から、食事はできません	・食事はできません ・飲水はできます	・飲水は、臥床したままできます ・医師の指示後、食事ができます	・制限はありません					
活動・安静	・制限はありません	・病棟内でお過ごしください	・帰室後4時間はベッドで臥床したままとなります。寝返りはうてますが、穿刺した方の足は曲げないでください ・医師が穿刺部を確認後、異常がなければ病棟内は歩けます。初めて歩くときは看護師が付き添いますのでナースコールでお知らせください	・制限はありません					
清潔	・除毛後に、シャワー浴をしてください	・洗面、歯磨きを済ませてください		・身体を拭きます	・シャワー浴ができます				
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒転落予防について説明します ・治療オリエンテーションを行います						・退院後の生活について説明します	・薬剤師が、退院後の薬剤について説明します	
その他	・同意書は職員にお渡しください ・手足の爪を切り、マニキュアは落としてください ・化粧は落としてください 【必要物品】 ・T字帯　1枚　・ストロー又は楽のみ ・飲用水（500mlペットボトル）　1本	・検査衣に着替えます ・義歯、コンタクトレンズ、時計、アクセサリー等は外し、各自保管してください ・貴重品は、ご自身又はご家族で管理してください						・病棟スタッフが、退院処方の必要性や処方の確認を行います	
			・痛みや吐き気があれば薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください						

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。

宮崎大学医学部附属病院
2025年2月承認
2026年10月更新