（作成者：クリニカルパス専門部会）

BRTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術）1日前入院

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院：1病日	2病日		3病日	4病日	5～7病日	8病日：退院	【退院後の生活について】
	治療1日前	治療当日（治療前）	治療当日（治療後）	治療後1日目	治療後2日目	治療後3～5日目	治療後6日目	
達成目標	・治療について理解できる						・退院指導の内容を理解できる	・定期的な通院を継続してください ・現在内服中の薬は、退院後も内服を続けます。利尿剤などの大切な薬があるので、自己判断で中断せず、医師の指示通りに内服して下さい ・緩下剤であるラクツロースを内服し、毎日便が出るように調整して下さい ・病気の性質上、たんぱく質の合成ができず低栄養になることがありますので、高たんぱく、高エネルギーの食事を摂るようにしてください ・肝臓病では飲酒が病気を重症化させます。禁酒を心掛けてください ・治療、入院により体力や下肢筋力の低下もあるため、無理せず散歩などから始め、体力の回復に努めてください。また、歩行時はゆっくり動くことを意識して、転倒に注意してください ・感染症にかかると、体力が奪われ、病状を悪化させる危険性が高まります。マスク着用、外出後の手洗い・うがいを必ず行ってください 以下の症状がある時はご連絡ください ・吐気、食欲不振 ・腹痛 ・黒色便 ・手足のむくみ ・肌や目が黄色い ・手が震えたり、意識がはっきりせず、会話・行動・書字がいつもと違う ・吐血 ・体調がすぐれない 【緊急連絡先】 ・診療日時間内（8：30～17：00） 内科外来： 0985-85-9883 ・休診日・診療日時間外 3階西病棟：0985-85-1745
			・吐血がない ・下血がない					
内服	・薬剤師が、持参薬及び服薬状況について確認します							
治療（IVR）		血管造影室で治療します						
注射		・点滴をします			・点滴を抜きます			
検査	・採血（2回） ・ICG検査 ・身長・体重測定		・採血/尿検査 （治療3時間後）	・採血 ・尿検査		・採血	・体重測定	
処置	・鼠径（足の付け根）部から大腿部を除毛します ・治療後の血流確認のため、両足の甲に印をつけます	・尿の管を入れます	・医師の診察後に穿刺部の圧迫を解除し、尿の管を抜きます					
食事	・制限はありません	・飲食はできません	・飲水できます ・治療後3時間を経て、食事ができます	・制限はありません				
活動・安静	・制限はありません		・治療後3時間はベッド上安静です。その後、制限はありませんが、初めて歩くときは看護師が付き添いますので、ナースコールでお知らせください	・制限はありません				
清潔	・除毛後にシャワー浴をしてください	・洗面、歯磨きを済ませてください	・シャワー浴はできません	・身体を拭きます	・シャワー浴ができます			
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・治療オリエンテーションを行います ・感染予防、転倒転落予防について説明します					・退院後の生活について説明します（治療後5日目）	・薬剤師が、退院後の薬剤について説明します	
その他	・同意書は職員にお渡しください ・手足の爪を切り、マニキュアは落としてください ・化粧は落としてください 【必要物品】 ・T字帯1枚　・水またはお茶500ml　2本 ・ストロー1本　・バスタオル1枚	・検査衣に着替えます ・義歯、コンタクトレンズ、時計、アクセサリー等は外し、各自保管してください ・貴重品は、ご自身又はご家族で管理してください ・ご家族は、血管造影室の前でお待ちください					・病棟スタッフが、退院処方の必要性や処方の確認を行います	
			・痛みや発熱、吐き気があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください					

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。

宮崎大学医学部附属病院
2024年7月承認
2026年10月更新